

LISTA DI CONTROLLO PER I MEDICI PRESCRITTORI

Lei sta prescrivendo o rinnovando la prescrizione di **EMERADE®** il nuovo auto-iniettore di adrenalina per il trattamento dell'anafilassi nei suoi pazienti. Questa lista di controllo la aiuterà a **fornire al paziente tutte le indicazioni per ottimizzare il corretto utilizzo, la somministrazione e la conservazione di Emerade®.**

IL PAZIENTE DEVE COMPRENDERE:



**CHE DEVE PORTARE SEMPRE CON SÉ
2 AUTO-INIETTORI DI EMERADE®**



QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO EMERADE® :

Uno qualunque dei seguenti sintomi potrebbe indicare che lei o suo/a figlio/a o un'altra persona sta manifestando una reazione anafilattica e necessita con urgenza di una iniezione di adrenalina.

Manifestazioni cutanee	▶ Orticaria generalizzata - prurito - arrossamento
Disturbi alle vie respiratorie	▶ Gonfiore della lingua - gonfiore/costrizione alla gola - difficoltà nella deglutizione
Problemi respiratori	▶ Difficoltà di respirazione / respirazione rumorosa - sibilo e /o tosse persistente
Ridotto stato di coscienza	▶ Sensazione di svenimento - capogiro - stato confusionale - perdita di coscienza - pallore e debolezza (bambini)



COME USARE EMERADE® :

Pazienti, familiari e insegnanti devono essere istruiti sull'uso corretto dell'auto-iniettore



RIMUOVERE
la protezione
dell'ago.



PREMERE sulla parte esterna della coscia e mantenere per **5 SECONDI.**

- > Emerade® deve essere iniettato esclusivamente nella parte anteriore laterale della coscia
- > Massaggiare delicatamente la sede dell'iniezione
- > Chiamare il "118" o il "112" (in tutti i paesi europei) e dire "anafilassi"

In assenza di un miglioramento clinico può essere eseguita una seconda iniezione di Emerade® dopo 5-15 minuti dalla prima iniezione.



QUALE DOSE DI EMERADE® HO PRESCRITTO E QUAL È IL SUO COLORE:

150 μg



300 μg



500 μg



La dose di Emerade dipende dal peso corporeo del paziente e si potrebbe dover variare la dose in caso di aumento o calo ponderale.

Dosaggi:

Per peso corporeo superiore a 60 kg, la dose raccomandata è 300-500 mcg, secondo valutazione clinica.

Il paziente pesa meno di 15 kg, tra i 15 e i 30 kg o più di 30 kg?

Bambini di peso corporeo inferiore a 15 kg: uso non raccomandato.

Bambini di peso corporeo compreso tra i 15 kg e i 30 kg: 150 mcg.

Bambini di peso corporeo superiore ai 30 kg: 300 mcg.



COME CONSERVARE EMERADE®:

- Conservare a temperatura inferiore a 25°C.
- Non congelare.
- Non usare questo medicinale dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.
- La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese. Eliminare e sostituire Emerade® alla scadenza.
- Controllare periodicamente la soluzione attraverso la finestrella di ispezione dell'unità sollevando l'etichetta, per assicurarsi che la soluzione sia limpida e incolore. Eliminare Emerade® e procurarsi una nuova confezione se la soluzione ha cambiato colore o contiene particelle.
- Controllare l'auto-iniettore in caso di caduta. Sostituirlo se si notano danni o perdite.
- Non rimuovere la protezione dell'ago se non immediatamente prima dell'iniezione.
- Emerade® deve essere conservato nella sua confezione originale.
- Le penne di prova devono essere conservate separatamente da Emerade® farmaco con il principio attivo, per evitare possibili scambi.



HO CONSEGNATO AL PAZIENTE LA PENNA DI PROVA E IL MATERIALE INFORMATIVO SU EMERADE®



HO RACCOMANDATO AL PAZIENTE DI CONSULTARE IL SITO DI EMERADE®

WWW.EMERADE-BAUSCH.COM E DI GUARDARE IL VIDEO CHE ILLUSTRÀ IL SUO CORRETTO UTILIZZO

Per segnalare una reazione avversa:

<http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa>